

شماره: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
تاریخ:
پیوست بدارد

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ...

موضوع: راهنمای کشوری زایمان بی درد

با سلام

احتراماً همانگونه که مستحضرید ترویج زایمان طبیعی یکی از برنامه های تحول نظام سلامت است. در این برنامه استفاده از روشهای دارویی برای زایمان بدون درد از راهکارهای افزایش زایمان طبیعی است. با توجه به اهمیت موضوع، پروتکل زایمان بدون درد در راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان توسط متخصصین محترم بیهوشی، انجمن علمی بیهوشی موضعی و درد ایران، هیئت بورد بیهوشی و کمیته کشوری سلامت مادران مورد باز نگری قرار گرفت. به پیوست "بروتکل زایمان بی درد" جهت بهره برداری در بیمارستانها حضورتان ارسال می گردد.

لازم به ذکر است راهنمای فوق به عنوان مرجع علمی و مرجع قضاؤت کشور طی نامه شماره ۱۰۲۲/۱۰۰ مورخ ۹۱/۷/۱۲ و نامه شماره ۱۱۰۵۶/۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۲ به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.

دکتر محمد اسماعیل مطلق
مدیر کل دفتر سلامت تحقیقت، خانواده و مدارس

پرستش
جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دستور
۱۳۹۳، ۷، ۱۲، ۱۴۶۱، ۲۲

(*)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستور

رئيس محترم کمیسیونهای پزشکی قانونی

رئيس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

در راستای ارتقا سلامت مادران و کاهش مرگ و میر و افزایش اثربخشی خدمات به این گروه "راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان" توسط کمیته کشوری اعلانی سلامت مادران و بار اساس علوم مبتنی بر شواهد و کتب مرجع در وزارت متبع تهیه و توسط هیئت بورد تخصصی زنان و زایمان تأیید شده است. این راهنمای پس از آموزش به عنوان مرجع علمی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ گردید.

بنابراین به منظور یکسان سازی معیار تضاروت و جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، مقتضی است از مجموعه فوق برای کارشناسی پرونده‌ها به عنوان مرجع تضاروت در کمیسیونهای تخصصی استفاده گردد. بدینهی ایست در خصوص میباشد که در این راهنمای آنها پرداخته نشده، مقابع علمی معتبر برای تضاروت مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر وحید دستجردی
دستور

(۲)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و امور پرورشی

معاونت بهداشت

معاونت درمان

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان به عنوان مرجع علمی کشور

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، در راستای کاهش مرگ مادران، ارتقای سلامت آنان، بهبود کیفیت و افزایش اثر بخشی خدمات "راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان" توسط اداره سلامت مادران و بر اساس علوم مبتنی بر شواهد و کتب مرجع در وزارت متبع تهیه و توسط هیئت بورد تخصصی زنان و زایمان طی نامه شماره ۱۱۲/ط ت/م مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۱ تأثید شده است.

بر همین اساس کتاب مذکور می‌بایست به عنوان مرجع علمی کشور در ارائه خدمات و آموزش‌های مامایی و زایمان (متخصصین زنان و زایمان، ماماهای، دانشجویان رشته‌های فوق و پزشکی) مورد استفاده قرار گیرد. به منظور به روز شدن اطلاعات مجموعه فوق هر سه سال یکبار بازنگری می‌شود. همچنین با توجه به نامه مقام محترم وزارت به شماره ۱۰۰/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ به منظور یکسان سازی معیار قضاؤت و جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، برای کارشناسی پرونده‌ها مجموعه فوق به عنوان مرجع قضاؤت در کمیسیونهای تخصصی می‌باشد.

دکتر سید حسن امامی رضوی
معاون درمان

دکتر علیرضا مصدقی نیا
معاون بهداشت

(۴)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و امور پرورشی

معاونت بهداشت

معاونت درمان

بسمه تعالیٰ

شماره ۱۱۰۵۶ / ۱۴ دی ۱۳۹۱
تاریخ ۲۳ آگوست
پیوست ندارد

راهنمای کشوری زایمان بی درد – روش‌های داروئی

نویسنده‌گان:


۱. آقای دکتر فرناد ایمانی- متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران
۲. خانم دکتر نسرین فریدی- متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳. آقای دکتر آرمان طاهری- متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴. آقای دکتر نوید ابوالاحرار- متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی
۵. آقای دکتر سعید رضا انتظاری- متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۶. خانم دکتر پوپک رحیم زاده - متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۷. آقای دکتر امیر علی اورندی- متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

زیر نظر: اداره سلامت مادران و کمیته کشوری سلامت مادران

دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۳۹۴



زایمان بی درد

زایمان منجر به درد شدید برای بسیاری از زنان می شود. وقتی مادر تحت مراقبت یک پزشک است در حالیکه امکان مداخله این وجود دارد، هیچ جایی برای تجربه درد شدید وجود ندارد. لذا این حق مادر است که زایمان بدون درد داشته باشد. تقاضای مادر دلیل کافی برای کاهش درد طی زایمان است.

تقاضای زایمان بدون درد:

- ✓ هر مادر حق درخواست روش بی دردی زایمان را دارد.
- ✓ انتخاب زایمان بی درد داوطلبانه است.
- ✓ پس از انتخاب زایمان بی درد می بایست از مادر رضایت آگاهانه گرفته شود.
- ✓ تیم زایمان بی درد شامل متخصص زنان، متخصص بیهوشی، ماما، تکنسین بیهوشی است که می بایست برای فراهم سازی زایمان بی درد با هم هماهنگ شوند.
- ✓ درخواست انجام زایمان بی درد توسط متخصص زنان و زایمان در پرونده ثبت گردد.
- ✓ انتخاب روش مناسب بی دردی توسط متخصص بیهوشی و با نظر بیمار انجام می شود.

شرط لازم برای زایمان بدون درد :

۱. امکان انجام زایمان طبیعی وجود داشته باشد.
۲. درد زایمان وجود داشته باشد و زایمان وارد مرحله فعال شده باشد.
۳. مادر باردار متقارضی کاهش درد زایمان باشد.

نکته: در بیماریهای سیستمیک مثل بیماری‌های افزایش فشار خون حین حاملگی، برخی از انواع بیماری‌های قلبی و ریوی و اختلالات زایمان مثل انقباضات ناموزون رحمی و همچنین امکان زیاد استفاده از وسایل حین زایمان، انجام زایمان بیدرد اندیکاسیون دارد.

کنتراندیکاسیونهای مطلق زایمان بدون درد :

۱. عدم رضایت مادر باردار
۲. به کنتراندیکاسیون‌های استفاده از هر روش توجه شود.

تبصره ۱: مادران سزارین قبلی که درخواست انجام زایمان طبیعی و اندیکاسیون زایمان طبیعی را دارند نیز می توانند از این روش بی دردی استفاده کنند. (در این موارد دقت های لازم در

خصوص حفظ اینمی مادر باردار با هماهنگی کامل متخصص زنان و متخصص بیهودشی لحاظ گردد.

تبصره ۲: بطور کلی حاملگی خطر عمد برای بیمار قلبی محسوب می‌شود. عمد ترین اثر بی‌دردی ناحیه ای (اسپاینال و اپی دورال)، کاهش مقاومت عروق سیستمیک و افت فشار خون است. طی حاملگی مقاومت عروق سیستمیک (SVR) کاهش می‌یابد که با استفاده از بی‌حس کننده‌های موضعی افت SVR به دلیل بلوك سمپاتیک تشیدید می‌شود.

اثرات بی‌دردی و بی‌حسی قابل پیش‌بینی است و برخی مادران دارای بیماری‌های قلبی از این اثرات سود می‌برند مثلاً در نارسایی دریچه‌ای میترال و آئورت و یا نارسایی بطن چپ، کاهش افترلود ناشی از بی‌دردی ناحیه‌ای مفید است هر چند که باید مراقب بود تا از مایع درمانی بیش از حد اجتناب شود. در بیمارانی که مقاومت عروق ریوی آنها بالاست (مخصوصاً آنهایی که هیپرتانسیون ریوی اولیه دارند) یا آنهایی که بازده قلبی ثابت دارند (مثل AS یا کاردیومیوپاتی انسدادی) کاهش فشار شریانی سیستمیک یا مقاومت تحمل نمی‌شود. با وجود این هیپوکسی، هیپرکاربی و اسیدوز همه منجر به افزایش فشار شریان ریوی و مقاومت عروق ریوی می‌شود. زایمان طولانی بدون تسکین درد کافی، استفاده از مخدراهای سیستمیک، شوک و هیدراتاسیون ناکافی همه از عوامل خطر برای این بیماران به شمار می‌روند. استفاده از مخدراهای نخاعی به تنها بی‌دردی ایجاد می‌کند بدون آنکه تغییر واضحی در SVR بوجود آورد ولی بی‌دردی کافی در اواخر مرحله اول و مرحله دوم زایمان فراهم نمی‌کند. بی‌دردی اپیدورال با بی‌حس کننده‌های موضعی، پاسخ‌های استرس زایمان را کاهش می‌دهد و در صورتی که با دقت زیاد تیتره شود اینمی است.

از غلظت‌های پایین بی‌حس کننده‌های موضعی به همراه یک مخدر می‌توان استفاده نمود تا به این ترتیب اثرات بی‌دردی به حداقل و اثرات قلبی - عروقی به حداقل برسد. دیگر روش رژیونال/نوروآگزیال برای بیماران قلبی، استفاده از بی‌دردی اپیدورال - اسپاینال ترکیبی (CSE) است که ثبات قلبی عروقی در این روش بیشتر بوده و بی‌دردی مؤثری ایجاد می‌کند. در بیماران قلبی با ریسک بالاتر می‌توان از بی‌دردی نخاعی مداوم یا تک دوز با استفاده از اپیوئیدها سود جست.

کتراندیکاسیون‌های مطلق رژیونال/نورآگزیال :

۱. عدم رضایت خانم باردار
۲. عدم توانایی خانم باردار برای حفظ بی‌حرکتی حین انجام کار
۳. وجود اختلال انعقادی و نقائص هموستانز
۴. افزایش فشار داخل جمجمه به هر علت (ضایعات فضای غیر و...)
۵. عفونت موضعی محل انجام تزریق و باکتریمی

کتراندیکاسیون‌های نسبی رژیونال/نورآگزیال :

با توجه به شرایط بیمار و تجربیات متخصص بیهودشی درباره انجام یا عدم انجام آن تصمیم‌گیری می‌شود:

۱. سابقه حساسیت به داروهای بی‌حس کننده یا سایر داروهای مصرفی در این روش‌ها
۲. ضایعات حاد سیستم عصبی مرکزی

۳. اختلال همودینامیک در مادر (هیپوولمی - هیپوتانسیون)
۴. بیماری های قلبی که بازده قلبی را شدیداً محدود کرده باشد.
۵. وجود دیسترنس جنینی
۶. عدم مهارت متخصص بیهوشی

عوارض بی دردی رژیونال/نورآگزیال:

۱. هیپوتانسیون
۲. خارش
۳. تهوع
۴. سردرد به دنبال سوراخ شدن دورا (به صورت خواسته در اسپاینال و به صورت ناخواسته در اپیدورال)
۵. اختلال کار کرد مثانه پس از زایمان
۶. تضعیف تنفسی با استفاده از مخدراها به هر روشی که تجویز شوند.
۷. عوارض نادر شامل: بلوک نخاعی کامل، منزئت و منزئیسم، آرکنوئیدیت، آبسه و هماتوم اپیدورال، آسیب عصبی موقت (Transient Neurological Defect)

شرایط لازم برای انجام روش بی دردی رژیونال/نوروآگزیال:

۱. اخذ رضایت‌نامه از بیمار مطابق قوانین
۲. حضور مداوم کارشناس یا کارдан هوشبری زیر نظر متخصص بیهوشی
۳. ویزیت مادر توسط متخصص بیهوشی
۴. مهیا و در دسترس بودن ست احیاء بزرگسال
۵. بر قراری راه وریدی و مایع درمانی مناسب قبل از انجام بلوک
۶. مانیتورینگ قلب جنین، سمع صدای قلب جنین یک بار قبل از بی حسی و یک بار بعد از بی حسی (سپس مطابق پروتکل راهنمای کشوری خدمات مامایی)
۷. مانیتورینگ ضربان قلب، فشار خون مادر و ساقچویریشن اکسیژن و الکترو کاردیوگرافی
۸. توجه به حالی بودن مثانه
۹. توجه به داروهای تجویز شده طی مدت بستری (به ویژه مخدراها)

۱۰. در دسترس بودن داروهای ضروری برای مقابله با عوارض احتمالی (افدرين و ...، آنتی کولینرژیک تازه در سرنگ کشیده و نام دارو نوشته شده باشد). وجود سایر داروهای لازم دیگر مثل تیوبینتال یا دیازپام برای درمان تنفس احتمالی، نالوكسان برای درمان دپرسیون تنفسی و ...

تجهیزات استاندارد برای اپیدورال، اسپاینال، انتونکس و درمانهای کمکی بی دردی:

۱. پالس اکسی متر
۲. الکتروکاردیوگرافی
۳. دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی
۴. کپسول اکسیژن
۵. ست کامل احیا و حفظ راه هوایی (مثل لارنگوسکوپ، لوله تراشه، ایروی، آمبو بگ، تی پیس و داروهای نسدونال و ساکسینیل کولین و لیدوکائین)
۶. ساکشن
۷. سرنگ‌های ۲، ۵ و ۱۰ سی سی، آنزیوکت
۸. سونی کید یا مانیتورینگ الکترونیکی پایش قلب جنین
۹. ست احیای نوزاد
۱۰. داروهای لازم برای احیا (مثل اپی نفرین، آتروپین، نالوكسان و ...)
۱۱. داروهای لازم برای اسپاینال و اپیدورال
۱۲. ست مخصوص اپیدورال (سوزن و کاتتر اپیدورال)
۱۳. ست مخصوص اسپاینال با سوزن‌های ترجیحاً با قطر کمتر
۱۴. دستکش استریل و ماده ضد عفونی کننده
۱۵. پمپ انفوزیون
۱۶. دستگاه PCEA (Patient–Controlled Epidural Analgesia)

تجهیزات ۱۰-۱۱ در تمام موارد زایمان بدون درد و ۱۱-۱۶ در نوروآگزیال بر اساس نوع و روش انتخابی مورد نیاز است.

نکات قابل توجه در آنالژزی اپیدورال لومبار:

پس از هیدراته کردن خانم باردار و حفظ ارتباط مداوم کلامی با وی، بلوک اپیدورال مطابق منابع علمی انجام می شود. اولین دوز باید توسط متخصص بیهوشی تزریق شود. توجه به نکات زیر توصیه می شود:

- ۱- فشار خون و ضربان قلب مادر کنترل شود. ضربان قلب جنین مطابق پروتکل (قبل و بعد از بلوک) توسط مراقب زایمان (ماما یا متخصص زنان) کنترل شود.
تذکر: در پوزیشن لترال معمولاً فشارخون در سمت Non dependent (دست یا پایی که بالا تر قرار دارد) از مقدار واقعی کمتر است.
- ۲- در صورتی که کاهش فشارخون بیش از ۲۰ میلی متر جیوه و یا ضربان قلب کمتر از ۶۰ بار در دقیقه شود (یا افت بیش از ۲۰ درصد از مقدار پایه داشته باشد)، انجام اقدامات زیر ضروری است :

- ❖ قرار دادن بیمار در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ و ترندنبرگ و بالا آوردن قسمت پایین تخت
- ❖ تجویز اکسیژن
- ❖ هیدراتاسیون کافی
- ❖ قطع انفوزیون اپیدورال
- ❖ در صورت عدم کفایت اقدامات بالا ، تجویز افردین ۵-۱۰ میلی گرم
- ❖ تجویز آتروپین mg ۵/۰ در صورت برadiکاردی همراه با افت BP
- ۳- کنترل و چارت سطح بلوک هر یک ساعت (تحرک پاها باید حفظ شود) و اقدام بر طبق ضوابط زیر:
- ❖ اگر بلوک در حد T4 یا بالاتر باشد \leftarrow توقف انفوزیون و حضور پزشک متخصص بیهوشی
- ❖ بلوک تغییر خاصی نداشته و بیمار درد ندارد \leftarrow اقدام اضافی لازم نیست.
- ❖ بلوک به طرف پایین بدن مثلاً از T10 رفته ولی بیمار درد ندارد \leftarrow هیچ اقدامی لازم نیست.
- ❖ اگر بلوک به طرف پایین بدن زیر T10 رفته و یا بیمار درد دارد \leftarrow تزریق یک دوز Top-UP بولوس در نظر گرفته شود.

توجه: اگر بیمار در هر زمان درد داشته باشد، قبل از تزریق هر دارویی ابتدا باید سطح بلوک حسی و حرکتی کنترل و ثبت گردد.

تذکر: دوز Top-UP بولوس: تزریق اپیدورال متناوب بی حس کننده موضعی از طریق کاتتر با غلظت های مختلف بوپیواکائین یا روپیواکائین از ۰/۰۶۲۵ درصد تا حداقل ۰/۱۲۵ درصد می تواند انجام شود. حداقل دوز Top-UP بولوس در حد یک تست دوز است (بوپیواکائین) بطور مثال cc ۲۰ از محلول ۰/۰۶۲۵ mg یا cc ۱۲ از محلول ۰/۱۲۵ mg)

۴- پس از اتمام زایمان و انتهای کار، کاتتر را از پشت بیمار خارج کرده و کامل و سالم بودن کاتتر خارج شده باید در پرونده ثبت گردد. در صورتیکه کاتتر کامل خارج نشد می بایست مشاوره با متخصص جراح مغز و اعصاب داده شود.

نکته: اپیدورال باید تا تولد نوزاد و برخی اوقات تا مراحل اولیه بعد از زایمان ادامه یابد. متوقف کردن آن در دیلاتاسیون کامل به منظور انجام زایمان خودبخودی صحیح نیست و باعث افزایش دردهای تاخیری زایمان می شود.

اندیکاسیونهای نگه داشتن کاتتر اپیدورال بعد از زایمان:

۱. پارگی درجه ۳ و ۴ و ابی زیاتومی وسیع
۲. احتمال زیاد مداخلات جراحی مثل باقیماندن جفت یا هماتوم

نکات قابل توجه پس از زایمان:

۱. از نظر اتساع مثانه و احتباس ادرار مادر را بررسی کنید. (بلوک نوروآگزیال می تواند عملکرد مثانه را تا ۱۲ ساعت مختل کند.)
۲. در صورت دریافت مرفين و انجام اپیدورال و اسپاینال باید ۲۴ ساعت بعد از آن عملکرد مثانه را چک کرد.
۳. قبل از به راه افتادن مادر، خطر افتادن وی را بررسی کنید.
۴. قدرت بالا آوردن و نگه داشتن هر دو پارا (SLR) را بررسی و ثبت نمایید.
۵. ابتدا مادر را بنشانید تا از سنکوب ناشی از هیپوتنتشن وضعیتی یا اثرات دارویی جلوگیری شود.
۶. قبل از راه افتادن مشخص کنید آیا مادر قادر به ایستادن و تحمل وزن در نزدیکی تخت می باشد. خطر افتادن وی را بررسی کنید.

اپیدورال استاندارد

اپیدورال Single: در مواردی که زایمان در فاصله زمانی کوتاه (۱۵-۱ ساعت) رخ می دهد این روش را بکار می برند. تکنیک اپیدورال بدون گذاشتن کاتتر انجام می شود. پس از تزریق تک دوز دارو از طریق سوزن اپیدورال، سوزن بیرون کشیده می شود.

*: بلوک اپیدورال به شکل single injection به دلیل کوتاه و محدود بودن مدت بی دردی کمتر توصیه می شود و بهتر است تا حد امکان از اپیدورال مداوم استفاده گردد.

داروهای مصرفی اپیدورال:

الف - Local Anesthetic ۱۰-۱۵ میلی لیتر بوپیواکائین ۰/۱۲۵ تا ۰/۰۶۲۵ درصد یا روپیواکائین ۰/۰۶-۰/۱ میلی لیتر لیدوکائین ۱٪ به صورت تک دوز منفرد در فضای اپیدورال تزریق می گردد.

ب - Opioid: در زمان استفاده از اپیوئیدها باید احتمال دپرسیون تنفسی مادر و نوزاد در نظر گرفته شده و دقیقاً مانیتور شود. احتمال دپرسیون تنفسی با مورفین بیشتر از بقیه اپیوئیدها است.

داروهای مخدر اپیدورال:

Opioid	دوز	شروع اثر	طول اثر
پتیدین	۲۰-۶۰ میلی گرم	۵ دقیقه	۲/۵-۶ ساعت
فنتانیل	۵۰-۱۰۰ میکروگرم	۵-۱۰ دقیقه	۲-۴ ساعت
سوفنتانیل	۵-۱۰ میکروگرم	۵-۱۰ دقیقه	۱-۲ ساعت

انفولیون اپیوئید	دوز
فنتانیل	۱-۲ $\mu\text{g}/\text{ml}$
سوفنتانیل	۰/۱-۰/۳ $\mu\text{g}/\text{ml}$

ج - افزودن اپیوئیدها به بی حس کننده های موضعی، باعث تشدید اثر بی دردی شده و همچنین دوز مورد نیاز بی حس کننده های موضعی و احتمال بلوک حرکتی ناشی از آنها را کاهش می دهد. نوع و مقدار هر یک از داروها براساس طول مدت نیاز به بی دردی و وضعیت جنین تعیین می گردد. (بطور مثال اگر جنین پره ترم است، بدلیل حساسیت بیشتر به اثرات دپرسیون تنفسی مخدراها بهتر است در صورت امکان از مخدراها استفاده نشود و یا در صورت استفاده، داروی مورفین انتخاب نگردد).

میزان مخدر مصرف شده برای مادر به هر روش (وریدی، عضلانی و) توسط متخصص زنان باید به اطلاع متخصص بیهوشی رسانده شود تا متخصص بیهوشی دوز دارو را تنظیم نماید. در صورت استفاده از مخدراها با توجه به احتمال دپرسیون تنفسی، مانیتورینگ مادر و جنین با دقت بیشتری (مطابق پروتکل راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان) انجام شود.

اپیدورال : Continual

۱. بلوک اولیه: به یکی از روشهای زیر انجام می پذیرد:

a. بوپیواکائین ۱۲۵-۰/۰۶۲۵ درصد یا روپیواکائین ۰/۰-۱۰ درصد ۱۵-۱۰ میلی لیتر

- b. بوپیوکائین ۱۲۵-۰/۰۶۲۵-۰/۰ درصد یا روپیوکایین ۲/۰-۱/۰ درصد + فنتانیل ۵۰ میکروگرم در حجم ۱۵-۱۰ میلی لیتر
- c. بوپیوکائین ۱۲۵-۰/۰۶۲۵-۰/۰ درصد یا روپیوکایین ۲/۰-۱/۰ درصد + سوفنتانیل ۱۰ میکروگرم در حجم ۱۵-۱۰ میلی لیتر
۲. ادامه آنالژزی: پس از تزریق اولیه به یکی از سه روش a یا b یا c در بند یک، ادامه بی دردی به یکی از روش‌های الف، ب یا ج انجام می‌پذیرد:
- الف) تزریق متناوب intermittent: بر اساس نیاز و درد بیمار هر ۳۰ دقیقه تا یک ساعت ۱۰-۵ سی سی از محلول بوپیوکائین ۱۲۵-۰/۰۶۲۵-۰/۰ درصد یا روپیوکایین ۲/۰-۱/۰ درصد تکرار کنید.

ب) تزریق مداوم Continuous: انفوزیون ۸-۱۰ ml/h از یکی از محلولهای زیر استفاده کنید:

I بوپیوکائین ۱۲۵-۰/۰۶۲۵-۰/۰ درصد یاروپیوکایین ۲/۰-۱/۰ درصد + فنتانیل ۱-۲ μ/ml

II بوپیوکائین ۱۲۵-۰/۰۶۲۵-۰/۰ یا روپیوکایین ۲/۰-۱/۰ درصد + سوفنتانیل ۳μ/ml

III بوپیوکائین ۱۲۵-۰/۰۶۲۵-۰/۰ یا روپیوکایین ۲/۰-۱/۰ درصد بدون مخدر

ج) PCEA (ابیدورال کنترله توسط بیمار) انتخاب یکی از محلولهای I یا II یا III و استفاده از آن به یکی از دو روش زیر:

i. بر اساس نیاز بیمار بولوس های ۴ سی سی با فواصل ۲۰-۱۰ دقیقه

ii. انفوزیون مداوم به اضافه مقدار مورد نیاز بیمار

۴-۸cc/h

بولوسهای ۲-۳ ml به فواصل ۲۰-۱۰ دقیقه

نکته ۱: مقدار تزریق با هر غلظتی بایستی از دوز TOP UP بولوس بیشتر نشود.

نکته ۲: حداقل تجویز با هر روش ۲۰-۱۵ سی سی در ساعت ml/h است.

نکته ۳: در صورت بی دردی ناکافی با هر یک از رژیم های فوق الذکر استفاده از محلولهای غلیظ تر یا استفاده از رژیم های همراه با مخدر توصیه می شود.

نکته ۴: وقتی مخدر نوروآگزیال استفاده می شود بیمار باید از نظر ونتیلاسیون (تعداد تنفس و عمق تنفس) اکسیژناسیون (پالس اکسی متري) سطح هوشیاری کنترل شود.

نکته ۵: در صورت تجویز تک دوز مخدر نوروآگزیال لیپوفیلیک (فنتانیل یا سوفنتانیل) در ۲۰ دقیقه اول پس از تزریق می بایست بیمار از نظر تنفسی به طور مداوم مانیتور شود. سپس حداقل هر یک ساعت کنترل شود تا دو ساعت سپری شود.

نکته ۶: در صورت تجویز تک دوز مورفین در ۱۲ ساعت اول هر ساعت، سپس طی ۱۲ ساعت بعدی حداقل هر ۲ ساعت یک بار بیمار از نظر تنفسی چک شود.

نکته ۷: در صورت انفوزیون مداوم مخدر طی ۱۲ ساعت اول کنترل هر یک ساعت و سپس در ۱۲ ساعت بعدی هر ۲ ساعت و سپس هر ۴ ساعت بر اساس نوع و دوز دارو علائم حیاتی کنترل شود.

نکته ۸: در بیماران با ریسک بیشتر مثل چاقی، سندروم آپنه انسدادی و تجویز همزمان مخدراها باید توجه بیشتری به وضعیت هوشیاری و تنفس بیمار شود و نیز زمان ترخیص با دقت بیشتری تعیین شود.

توجه: بیمارانیکه جهت کنترل درد، مخدر به صورت عضلانی یا وریدی دریافت داشته و سپس اپیدورال یا اسپاینال می شوند در صورت استفاده از مخدر نوروآگزیال به شدت در معرض دپرسیون تنفسی هستند لذا توصیه می شود از تزریق مخدر نوروآگزیال جدا خودداری شود.

نکته ۹: اگر بعد از اپیدورال، مادر درد پایداری در یک قسمت را ذکر می کند به فکر missed segment باشد. ابتدا محل ورود کاتتر را بررسی کنید سپس مادر را روی سمت بلوك نشده بخوابانید و یک دوز اضافی بولوس شامل ۱۰ سی سی بوپیوآکائین ۱۲۵-۰/۰-۰/۲۵ درصد یا ۸ سی سی لیدوکائین ۱٪ + حداکثر ۱۰۰ میکروگرم فنتانیل تجویز نمایید.

فنتانیل در ۲ ساعت اول نباید بیش از ۱۰۰ میکرو گرم باشد و دوره های ۴ ساعته بعدی هم بیش از ۱۰۰ میکروگرم نباید تجویز شود. اگر این اقدامات جواب نداد کاتتر را ۱ سانتی متر خارج کنید(حداکثر ۳ سانتی متر) و مجدداً یک دوز بولوس بدھید. هرگز برای درست کردن یک اپیدورال ناکافی بیش از حد اصرار نکنید.

نکته ۱۰: درد پرینه آل یا سوپرا پوپیک مانند وقتی که جنین در وضعیت اکسی پوت پوستریور است: دوز بولوس شامل بوپیوآکائین ۵۰٪ یا فنتانیل ۵۰ میکروگرم بدھید و همین دوز را تکرار کنید. اما فنتانیل در ۲ ساعت اول نباید بیش از ۱۰۰ میکروگرم باشد و در دوره های ۴ ساعته بعدی هم بیش از ۱۰۰ میکروگرم نباید تجویز شود. برای تجویز این دوز بولوس، مادر باید در پوزیشن خوابیده به پهلوی چپ باشد. اگر این دوز بولوس جواب نداد جابجا کردن اپیدورال به سطح پائین تر ستون مهره ها را در نظر داشته باشید.

اپیدورال های مشکل دار، اپیدورال خونی:

۱. با سالین کانول را فلاش کنید و کمی کاتتر (۱ سانتی متر) را عقب بکشید و مجدداً آسپیره کنید تا زمانیکه دیگر خونی در آسپیریشن ظاهر نشود.
۲. اگر مقدار کافی کاتتر در فضای اپیدورال وجود دارد(۲/۵ تا ۳ سانتی متر) با احتیاط تست دوز شامل ۳ سی سی از محلول ۴۵ میلی گرم لیدوکائین بدون ماده نگهدارنده با یا بدون اپی تفرین ۱:۲۰۰۰۰۰ است.
۳. اگر این اقدامات شکست خورد محل اپیدورال را عوض کنید.
۴. اگر در یک فضا دو بار آسپیریشن خونی داشتید باید فضای اپیدورال را عوض کنید.
۵. همیشه قبل از تجویز بولوس آسپیره کنید.

داروهای مورد نیاز در اتاق زایمان بی درد:

تیوپنтал، ساکسینیل کولین، دیازپام، افردین، نالوکسان، آتروپین، مخدراها، بوپیوآکایین یا روپیوآکایین با غلظت‌های مختلف، میدازولام

اسپاینال :

اسپاینال Single :

۱ - LA (Local Anesthetic) اسپاینال به تنهایی: بوپیواکائین ۱/۲۵-۲/۵ mg یا روپیواکائین ۶-۸ mg بلوک S5-T10 می‌دهد. باید کنترل لازم به عمل آید چون ممکن است سطح بی‌حسی بالاتر رود.

زمان انجام اسپاینال به عنوان یک روش بی دردی مستقل، کاملاً وابسته به معاینه ماماگی است. بهترین زمان وقتی است که انتظار می‌رود طی ۲ ساعت آینده نوزاد متولد گردد.
 ۲ - (Combination): Opioid و Local Anesthetic در جدول زیر دوز و طول اثر داروهای مخدر استفاده شده در اسپاینال مشخص شده است.

Opioid	دوز	طول اثر
فنتانیل	۱۰-۲۵ میکروگرم	۳۰-۱۲۰ دقیقه
سووفنتانیل	۳-۵ میکروگرم	۶۰-۱۸۰ دقیقه
مپریدین	۱۰-۲۰ میلی گرم	در مراحل پیشرفته زایمان موثر است
مرفین	۰/۱ میلی گرم	

با افزودن دوز کم بوپیواکائین یا روپیواکائین (۱/۲۵ mg-۲/۵ mg) به مخدراهای داخل نخاعی کیفیت بی‌دردی و نیز مدت زمان بی‌دردی افزایش می‌یابد. (مخلوط مخدر و بی‌حسی)

مزیت اپیوئید اسپاینال :

این روش به ویژه در خانمهایی که می‌خواهند در اوایل مراحل زایمان قدم بزنند و نیز در بیماران قلبی که کوچکترین تغییرات SVR و فشار خون ناشی از بی‌حس کننده‌های موضعی اپیدورال را تحمل نمی‌کنند، کاربرد دارد.

عوارض اپیوئید اسپاینال :

- خارش

- هیپوتانسیون

- احتباس ادرار

- تهوع

- دپرسیون تنفسی

- تغییرات FHR به صورت خفیف و گذرا

- گیجی و منگی

❖ مانیتورینگ تنفسی در این روش همانند اپیوئید اپیدورال با توجه به نوع دارو، زمان اثر دارو تا حذف سیستمیک آن باید ادامه یابد.

: Saddle block

در مرحله دوم زایمان با تزریق دوزهای کم LA هیپریار ($1/25 \text{ mg} - 2/5 \text{ mg}$ بوپیواکائین) در فضای ساب آراکنوئید انجام می‌گیرد.

مادر به مدت چند دقیقه در وضعیت نشسته قرار می‌گیرد تا بلوك ناحیه ساکرال رخ دهد. می‌توان LA به تنها یی و یا همراه با مخدر استفاده کرد (دوزهای گفته شده در اسپانیال).

: (CSEA)

: Combined Spinal - Epidural Analgesia

: CSEA روش انجام

ابتدا با روش اسپانیال با استفاده از LA یا اپیوئید و یا مخلوط آن دو با دوزهای گفته شده در روش اسپانیال، بی دردی اولیه را ایجاد کرده و سپس ادامه بی دردی را با استفاده از کاتتر اپیدورال با استفاده از داروهای گفته شده در روش اپیدورال انجام می‌دهیم.

: مزایا CSEA

- تسکین سریعتر درد

- کاهش دوز مورد نیاز LA تزریقی در فضای اپیدورال

- آنالژزی بهتر پرینه

- امکان حرکت بیشتر مادر

- رضایت بیشتر مادر

سردرد (که با سوزن‌های اسپاینال باریک تر بروز سردرد کاهش یافته است)

غیر رژیونال یا غیر نوروآگزیال/سیستمیک:

بی دردی استنشاقی:

بی دردی استنشاقی با استفاده از انتونکس صورت می‌گیرد. انتونکس عمدتاً به عنوان یکی از روش‌های کمکی همراه با سایر روشها برای بی دردی زایمان استفاده می‌شود. مصرف انتونکس می‌باشد با حضور و دستور متخصص بیهوشی توسط ماما یا تکنسین بیهوشی انجام شود تا در صورت بروز مشکل راه هوائی در بیمار، توسط ایشان و بزیت و درمان شود.

ENTONOX(انتونکس):

انتونکس به عنوان یکی از روش‌های کمکی همراه با سایر روشها برای بی دردی زایمان است. گاز اکسید نیترو و اکسیژن با غلظت ۵۰٪ از هر کدام است. در تمام مراحل زایمان کاربرد دارد. استفاده از آن آسان و ایمن است. زمانبندی دقیق برای تجویز و توجه به فواید انقباض به مادر باردار کمک میکند تا شروع آن را در ۳۰-۵۰ ثانیه قبل از شروع انقباض انجام دهد. سریعاً اثر میکند و با قطع مصرف اثرات آن سریع از بین میرود. عوارض جانبی شناخته شده ای ندارد. از جفت عبور می‌کند ولی اثری روی ضربان قلب جنین وجود داشته باشد بلافاصله بعد از تولد پاک می‌شود. پس از استنشاق سیستم مادری را طی ۵ دقیقه ترک می‌کند.

روش انجام:

۱. باید خانم باردار را با روش کار آشنا نموده و او را از بروز عوارض گذرا و بی خطر آن آگاه کرد تا از ترس و اضطراب وی کاسته شود. این عوارض شامل: سرگیجه، خواب آلودگی، سنگینی سر، احساس سبکی سر، رخوت و سستی، گزگز و مور مور نوک انگشتان و دور لبها، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، افت فشار خون و کاهش برون ده قلبی، احتمال ازدیاد بیش از حد دوز (Over Dose) و کاهش سطح هوشیاری است. در صورت بروز عوارض فوق مصرف گاز را متوقف کنید و حمایت راه هوایی را انجام دهید تا وضعیت مادر بهبود یابد. پس از بهبودی مجدداً می‌توان گاز را با غلظت کم شروع کرد.

۲. باید از برقراری تهوعیه اتاق مطمئن شد و دمای اتاق را بالای ۱۰ درجه سانتیگراد نگه داشت.
۳. استنشاق گاز باید ۳۰ ثانیه قبل از انقباض (اگر انقباضات منظم باشد) یا بلافاصله با شروع انقباضات آغاز شود و تا زمانی که انقباض شروع به کاهش میکند ادامه یابد. ماسک باید کاملاً اندازه و مطابق با صورت وی باشد.

خانم باردار را باید به تمکز روی تنفسهایش تشویق کرد و مدل تنفسی (دم عمیق- استراحت) را به او یادآوری نمود. دم و بازدم هردو درون ماسک انجام می‌

شود.

نکته: مادر در کلاسهای آمادگی برای زایمان نحوه تنفس صحیح را آموزش می بیند.

۴. زمانی که درد (انقباض رحم) به پایان رسید خانم باردار باید ماسک را از روی صورت خود برداشته و از هوای اتاق استنشاق نماید.(تنفس معمولی)
۵. در صورتی که همکاری خانم باردار مختل شود یا هوشیاری او کاهش یابد، تجویز گاز را قطع نموده و به جای آن اکسیژن داده شود.
۶. در مرحله دوم زایمان خانم باردار باید قبل از هر زور زدن ۲-۳ نفس عمیق بکشد.
۷. قبل یا حین استفاده از انتونکس تجویز اپیوئیدها نباید انجام شود، در صورت انجام با توجه به اینکه ترکیب این دو باعث کاهش سطح هوشیاری می شود، به دپرسیون تنفسی دقت شود.
۸. بیش از ۲۴ ساعت از انتونکس استفاده نشود زیرا ویتامین ب ۱۲ را با مداخله روی سنتز DNA غیر فعال می کند.

موارد احتیاط و ممنوعیت ها:

۱. ناتوانی در نگهداری ماسک توسط مادر
 ۲. شکستگی های ماغزیلوفاسیال
 ۳. اختلال سطح هوشیاری و مسمومیت
 ۴. اکسیژن رسانی مختل
 ۵. عفونت دستگاه تنفسی فوقانی یا بیماری تنفسی
 ۶. انحراف بینی، بیماری انسداد مزمن ریه
 ۷. دریافت مقدار زیاد مخدراهای وریدی
 ۸. کمبود ویتامین ب ۱۲ و مادران تحت درمان با ویتامین ب ۱۲
 ۹. جراحی فک و صورت در یک ماه اخیر
 ۱۰. انسداد گوش داخلی
 ۱۱. دیسترس جنینی
 ۱۲. وضعیت همودینامیک ناپایدار
 ۱۳. برخی بیماریهای قلبی نظریه هیپرتنسیون پولمونر
 ۱۴. راه هوایی مشکل
 ۱۵. پربودن معده مادر (صرف غذاهای جامد)
- توجه: در مادران اسکیزوفرنی با پولار با احتیاط مصرف شود.

درمانهای کمکی بی دردی زایمان با استفاده از داروهای وریدی :

شامل اپیوئیدها، آرامبخش‌ها است.

- میدازولام: با دوز کم $mg\text{--}1/5$ بیشتر جهت رفع اضطراب خانم باردار بکار می‌رود.

اپیوئیدهای سیستمیک:

به صورت تزریق عضلانی یا داخل وریدی استفاده می‌شود. باید توجه داشت که اپیوئیدها به صورت وابسته به دوز دپرسیون تنفسی در نوزاد ایجاد می‌کنند. دوزهای استفاده شده در زایمان به صورت زیر است:

نام دارو	دوز	دروغ	شروع بی دردی	طول اثر
مپردین IM (پتیدین)	۱۰۰-۵۰ میلی گرم	۵۰-۱۰۰ میلی گرم	۴۰-۵۰ دقیقه	۳-۴ ساعت
مپردین IV (پتیدین)	۲۵-۵۰ میلی گرم	۲۵-۵۰ میلی گرم	۵-۱۵ دقیقه	۳-۴ ساعت
فنتانیل IM	۱۰۰-۵۰ میکرو گرم	۱۰۰-۵۰ میکرو گرم	۷-۱۵ دقیقه	۱-۲ ساعت
فنتانیل IV	۲۵-۵۰ میکرو گرم	۲۵-۵۰ میکرو گرم	۳-۵ دقیقه	۳۰-۶۰ دقیقه
رمی فنتانیل IV (متناوب)	۲۵-۵۰ میکرو گرم هر ۵ دقیقه	۲۵-۵۰ میکرو گرم هر ۵ دقیقه	بلافاصله تا ۱ دقیقه	۵-۸ دقیقه
رمی فنتانیل IV (مداوم)	۰-۱۰ میکرو گرم / کیلو گرم / دقیقه	۰-۱۰ میکرو گرم / کیلو گرم / دقیقه	بلافاصله تا ۱ دقیقه	۵-۱۰ دقیقه پس از قطع انفوژیون

- پس از تزریق عضلانی مپردین به مادر، اگر نوزاد در فاصله ۲-۳ ساعت به دنیا بیاید بیشترین دپرسیون تنفسی را دارد ولی در فاصله زمانی ۱ ساعت و یا پس از ۴ ساعت این احتمال حداقل است.

پروماتازین $mg\text{--}25-50$ تزریق عضلانی برای پیشگیری از تهوع ناشی از مپردین می‌تواند استفاده می‌شود.

- با تجویز طولانی مدت رمی فنتانیل تجمع دارو رخ نمی‌دهد. این دارو یک تضعیف کننده قوی تنفسی است بنابر این باید حتماً با مراقبت کامل و تنظیم دقیق دوز تجویز گردد و بهتر است با استفاده از پمپ‌های انفوژیون دارای lockdown تنظیم شود. رمی فنتانیل انتخاب ارجح در بین روشهای غیر نوروآگزیال است.

عوارض اپیوئیدهای سیستمیک :

- تهوع و استفراغ

- احتمال دپرسیون تنفسی در مادر و نوزاد که در صورت وقوع، نالوکسان با دوز $4-1$ میکرو / کیلو گرم استفاده می‌شود.

References:

- 1) Chestnut's Obstetric Anesthesia: Principles and Practice. 5th Ed. Saunders. 2014.
- 2) Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice. 7th Ed. 2014
- 3) Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia: An Updated Report by The American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia. 2007.
- 4) Ronald D. Miller, MD, MS, Lars I. Eriksson, MD, PhD, FRCA, Lee A Fleisher et al. Miller's Anesthesia. Saunders. 8th ed. 2015.